HPV vaccination på vårdcentral

Bakgrund

HPV-vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och pojkar födda 2009 och senare upp till 18 års ålder. För barn födda före 2009 gäller kompletterande vaccination mot HPV bara flickor. Det innebär att barn erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte eller sjätte klass.

- De som inte har blivit vaccinerad i skolan, men som senare vill vaccinera sig, kan kontakta sin vårdcentral för vaccination.
- Den som vaccinerar sig på vårdcentral får betala en avgift på 600 kronor per dos.
- Barn som är 15 år eller äldre ska ha 3 doser.

Rutin för HPV-vaccination på vårdcentral

1. Patient hör av sig till vårdcentralen med önskan om att vaccinera sig mot HPV
2. Distriktssköterska kontrollerar med patienten att inga kontraindikationer föreligger och dokumenterar detta samt lägger ett administrativt ärende till läkare som tar ställning till vaccinationsordination.
3. Läkare ordinerar vaccination i läkemedelsmodul med ”favorit”
   Välj en av läkemedelsfavoriterna §gar OBS! för rekvisition
   - Gardasil 9 två-dosschema 9-14 år HPV vaccination i.m 0,6 mån
   - Gardasil 9 tre-dosschema från 15 år HPV vaccination i.m 0,2,6 mån
4. Sjuksköterska kollar att vaccinet finns hemma på vårdcentralen annars rekvireras vaccinet.
5. Besök bokas som distriktssköterskebesök. Patienten betalar 600 kr i kassan per dos. För registrering var god läs Kassalathund sid 7.
6. Distriktssköterska ger vaccinationen.
7. Doserna ska ges enligt FASS, se text nedan. Ny besökstid för injektion 2 bokas in i samband med första besöket. Samma rutiner gäller för besök för en eventuell 3:e injektion.

Vaccin: Gardacil 9 injektionsvätska, suspension, förfylld spruta.

Dosering

- Det är barnets ålder vid första dosen som avgör om det är två- eller tre-dosschema som ska följas. Vid vaccination före 15 års ålder gäller två-dosschema och för barn som fyllt 15 år gäller tre-dosschema.

- Vid vaccination enligt två-dosschema bör intervallet mellan doserna vara minst 6 månader. Doserna ges helst inom ett år, men vid längre intervall behöver inte vaccinationsserien startas om.
- I ett tre-dosschema rekommenderas att de två första doserna ges med 2 månaders mellanrum. Intervallet mellan dos två och tre bör vara minst 4 månader. Alla tre doser bör helst ges inom ett år, men vid längre intervall behöver inte vaccinationsserien börjas om eller extra doser ges.

Administreringssätt

Vaccinet ska administreras genom intramuskulär injektion. Vaccinet ges företrädesvis i överarmens deltoidmuskel eller i lårets anterolaterala del.

Gardasil 9 får inte injiceras intravaskulärt, subkutant eller intradermalt. Vaccinet får inte blandas i samma spruta med andra vacciner eller lösningar.