Kodningsmall när diagnos inte ställs

Syfte

För att underlätta val av diagnoskod när diagnos inte ställs inom Område psykiatri har följande kodningsmall med förslag på diagnoskoder tagits fram.

Genomförande

Samtliga besök inom psykiatrin ska dokumenteras och diagnossättas.

När diagnos fastställs efter utredning klassificeras diagnosen enligt sedvanliga regler med lämplig kod ur exempelvis kapitel 5 (F-kapitlet) i ICD10-SE.

Om diagnos inte fastställs vid besöket kan nedanstående förslag på symtomkoder användas.

Diagnostext	Kommentar	ICD-10
Agorafobi	Torgskräck	F40.0
Akut stressreaktion	Akut krisreaktion, akut reaktion på stress, kristillstånd, psykisk chock	F43.0
Alkoholbruk	Utesluter alkoholberoende	Z72.2
Andra och specificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning	Lindrig kognitiv störning	R41.8A
Andra problem som har samband med livsstil	Självdestruktivt beteende	Z72.8
Andra specifika reaktioner på svår stress	Utmattningssyndrom	F43.8
Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget	Självmordstankar	R45.8
Anpassningsstörning	Sorgereaktion	F43.2
Blandade ångest och depressionstillstånd	Tillstånd med ångest och depression, lindriga eller kortvariga	F41.2
Blodprov för påvisande av alkohol, droger eller läkemedel		Z04.0
Bristfällig social förmåga		Z73.4
Depression, återkommande		F33.-

Diagnostext	Kommentar	ICD-10
Depression, återkommande utan aktuella symtom	Patienten har tidigare haft två eller flera depressiva episoder enligt definitionen under F33.0-F33.3 men är sedan flera månader fri från symtom	F33.4
Depression, lindrig		F32.0
Depression, medelsvår		F32.1
Depression, svår		F32.2
Desorientering	Konfusion	R41.1
Drogbruk	Utesluter drogberoende	Z72.3
Dystymi		F34.1
Fascikulationer	Ryckningar	R25.3
Fysisk våldstendens		R45.6
Generaliserat ångestsyndrom	Ångestneuros, ångestreaktion, ångesttillstånd	F41.1
Hörselhallucinationer		R44.0
Hyperaktivitet		R46.3
Hypokondri		F45.2
Hypomani		F30.0
Irritabilitet och vrede		R45.4
Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden	Postpartum-depression	F53.0
Mani utan psykotiska symtom		F30.1
Manisk episod		F30.9
Mardrömmar		F51.5
Nervositet	Nervös spänning	R45.0
Olycklighetskänsla	Ospecificerade bekymmer	R45.2
Paniksyndrom	Panikattack, paniktillstånd	F41.0
Rastlöshet och upphetsning		R45.1

Diagnostext	Kommentar	ICD-10
Social fobi		F40.1
Specifika avgränsade fobier	Akrofobi, djurfobi, enkel fobi, klaustrofobi (se fördjupningskoder)	F40.2
Spel och vadhållning	Utesluter tvångsmässigt eller patologiskt spelberoende	Z72.6
Stress	Fysisk och psykisk stress	Z73.3
Synhallucinationer		R44.1
Tics		F95.9
Tillstånd med känslomässig chock och stress		R45.7
Tobaksbruk	Utesluter tobaksberoende	Z72.1
Tremor		R25.1
Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingar	Tvångsritualer	F42.1
Tvångssyndrom präglat av tvångstankar		F42.0
Tvångstankar med tvångshandlingar		F42.3
Undersökning för körkort	Om besöket endast avser undersökning för körkort	Z02.4
Utbrändhet	Utesluter utmattningssyndrom	Z73.0

Referenser

Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos, Socialstyrelsen

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård