

BCG + Checklista

BCG-VACCINATION INNAN HEMGÅNG FRÅN BB/SJUKHUS

Barnläkaren ansvarar för att ordinera och administrera BCG vaccin i barnets journal innan hemgång från sjukhus (inte på FV2) vid:

- aktuell aktiv TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt
- vid planerad resa till område med hög TB-förekomst innan BVC har skrivit in barnet och tar över hälsoansvaret.

BCG-VACCINATION VID 4-8 VECKORS ÅLDER PÅ BVC

PKU ska vara taget med negativt resultat från SCID-screening. Alla PKU är klara och utsvarat inom 2 v. BHV-ssk ordinerar.

- Rekommenderas till barn med familjeursprung med ett land med ökad eller hög risk för tuberkulos (TB), se [FHM aktuella lista*](#).

BCG-VACCINATION ÖVRIGA BARN INSKRIVNA PÅ BVC

- Rekommenderas till barn med familjeursprung från ett land med ökad eller hög risk tuberkulos- (TB-) förekomst, se [FHM aktuella lista*](#).

Nyanlända barn från länder med hög risk för tuberkulos provtags av AIH. För vaccination av ovaccinerade barn under 2 år ska TST vara 0 mm och för barn över 2 år ska IGRA vara negativ.



BCG-VACCINATION ÖVRIGA BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 18 ÅRS ÅLDER

- aktuell aktiv TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt (i samråd med behandlande läkare angående tidpunkt, ev. smittspårning och behandling för TB samt tidpunkt för BCG)
- för övriga barn och ungdomar som inte tillhör riskgrupper kan BCG-vaccination övervägas inför planerad längre vistelse (>3 mån) i land eller område med hög TB-förekomst, om personen kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen

ADMINISTRATION

- Behörig sjuksköterska har ordinationsrätt för BCG av barn i riskgrupp för TB.
- Använd Checklista/Manual inför vaccination ([Rikshandboken/BCG-vaccination](#)).
- Vaccination dokumenteras i BHV-journal Growth/Vaccinationsapp.

REKOMMENDERAS INTE VACCINATION/KONTRAINDIKATIONER

Se Folkhälsomyndigheten

[Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination](#)

Länder kan saknas på [FHM aktuella lista](#) tex. länder i krig/konflikter med bristfällig hälsoövervakning vilket medför att vaccination med BCG bör erbjudas.