

## Handläggning IVA patienter, vårdhygienisk riktlinje

### IVA- riktlinjer vid misstänkt eller konstaterad MRB/ luftburen smitta

#### Nödvändig medicinsk behandling får inte försenas på grund av misstänkt eller konstaterad förekomst av MRB/luftburen smitta.

Vid vård av patient med misstänkt/konstaterad MRB (multi resistent bakterier) eller luftburen smitta behöver basala hygienrutiner i vissa fall kompletteras med vård på enkelrum, eller enkelrum med luftsluss. Vid utbrott eller stor risk för utbrott av MRB kan kohortvård med särskilt avdelad personal behövas.

Spridning av MRB i vårdmiljöer gynnas av bristande följsamhet till vårdhygieniska rutiner. I vårdmiljöer med överbeläggning eller otillräckliga ytor kring vård- och behandlingsplatser riskeras också spridning av MRB. Vid sen upptäckt av smittbärare ökar risken för spridning.

Förutom odlings svar behöver man ta hänsyn till patientens eventuella riskfaktorer\* för spridning i miljön, och göra individuella bedömningar.

#### Förslag på vårdplats

##### Enkelrum med luftsluss

- Vattenkoppor, mässling, smittsam tuberkulos, stora bränn/sårskador (pga. ökad mängd hudflagor)

##### Enkelrum med stängd dörr

- Misstänkt eller konstaterad MRB med riskfaktorer\*
- Gastroenterit (diarré och/eller kräkning) och influensa

##### Samvård/tvåsal

- Misstänkt eller konstaterad MRB utan riskfaktorer i samråd med vårdhygien

#### Övrigt

- Informera städ- och service personal samt konsulter
- Kontakta vårdhygien för fortsatt handläggning

#### \*Utbreda hudlesioner eller diarré