


Tuberkulos, smittspårning – Indexpatientens behandlande läkare är ansvarig för smittspårningen



TB i övriga organ vanligen inte smittsam men ändå viktigt med smittspårning för att upptäcka smittkälla och andra personer som exponerats för smittkällan

Definition Positiv IGRA

Gränsen för positivt test är $\geq 0,35$ IU/mL
Resultat nära denna gräns (0,20-0,99 IU/mL) ska tolkas med försiktighet och bör kontrolleras om.

Definition Positiv TST

Barn <5 år, Immunsupprimerad ≥ 6 mm
Vuxna, Barn ≥ 5 år ≥ 10 mm

Tuberkulinomslag

Ökning med ≥ 6 mm för barn och immunsupp.
och ≥ 10 mm för övriga

Definition kontakter

Närkontakter – Personer med nära och långvarig kontakt med den sjuke, huvudsakligen familjemedlemmar och hushållskontakter

Mindre nära kontakter – Vänner, skolkamrater*, arbetskamrater*, lekkamrater och sjukvårdspersonal som har upprepade, men mer sporadiska kontakter med den sjuke.

* kan ibland räknas som nära kontakter

Hur länge har index varit smittsam

Beror på symtom och utbredning

- Högsmittsam index – upp till 3 månad innan diagnos.
- Lågsmittsam index – upp till 1 månad innan diagnos.