

Vattkoppor - vaccination

Allmän vaccination mot vattkoppor (varicella) utreds i Sverige. BVC påbjuder inte vaccination mot vattkoppor men vaccination erbjuds av BVC till barn som inte haft vattkoppor om föräldrar önskar få sitt barn vaccinerat.

Vaccination på BVC ges mot en avgift (kostnad: se [Avgiftshandboken](#)).

Dosering och vaccinationsschema

En vaccindos är 0,5 ml.

Vaccination kan ges från 9 månaders ålder och ges med 2 doser. Den andra dosen bör ges tidigast 3 månader efter den första dosen. Hos barn äldre än 12 månader kan andra dosen om det finns särskilda skäl ges med kortare intervall men aldrig kortare intervall än 4 veckor.

Ett barn som haft vattkoppor med lindriga symptom när barnet var yngre än ett år, kan få vattkoppor på nytt och rekommenderas vaccin mot vattkoppor med två doser.

Försök om möjligt att erbjuda vaccination vid ordinarie kontakter på BVC. Om BVC påbörjar vaccination mot vattkoppor så bör dos 2 ges på BVC innan barnet skrivs ut till förskoleklass/elevhälsan.

Vaccination mot vattkoppor kan kombineras med andra vacciner men på olika injektionsställen. Andra levande vacciner kan administreras samtidigt eller med 4 veckors intervall.

Vaccination mot vattkoppor ska ordinerars av läkare.

Vacciner

Vaccin som är upphandlat (t.o.m. 2025-08-31) är Varivax (MSD; Merck Sharp & Dohme).

En vaccinationsserie som påbörjats med Varilrix är (GSK; GlaxoSmithKline) kan fortsätta Varivax, och vice versa.

Varivax och Varilrix är levande vacciner och ges även likadant dvs. intramuskulärt (men subkutant till barn med blödningsrubbingar).