

PSA-provtagning på Vårdcentralsjouren Örebro

Innehållsförteckning

1	Inremiss från urologen	2
2	Vilka remisser avvisas	2
3	Struktur i inremissen	2
3.1	Remiss från VO Urologi	2
3.2	Avvisning.....	2
4	Medicinsk vårdadministratör tar emot remissen i RoS	3
4.1	Remissbekräftelse till VO Urolog	3
4.2	Remissbekräftelse till patient	3
4.3	Journalanteckning och diagnos	3
4.4	Beställning av prover i RoS.....	3
4.5	Kalla patient till provtagning	3
5	Genomgång av provsvar – sjuksköterska	4
5.1	Värdet är högre än individuella gränsen	4
5.2	Värdet är under individuella gränsen	4
5.3	PSA-värdet lägre än gränsvärde/meddelande till patient	5
5.4	Avslut normala värden	5
5.5	Uteblivna patienter	5
5.6	Avlidna patienter	5
5.7	Icke kurativa patienter under kontrollperioden	5

1 Inremiss från urologen

Inremisser från VO Urologi till centraliserad PSA kontroll gäller patienter som har genomgått SVF för prostatacancer utan att malignitet har påvisats.

Inremisser från urologen ska vara riktade till Vårdcentralsjouren (Vårdc Jour Örebro).

Inremiss från vårdcentraler som redan har tagit emot remisser från VO Urologi.

2 Vilka remisser avvisas

- Remisser som kommer från andra instanser än VO Urologi
- Remisser för PSA-kontroller för patienter som inte har genomgått SVF.
- Remisser för PSA-kontroller för patienter som har konstaterad prostatacancer.
- Remisser där uppgifterna för provtagningsproceduren avviker från överenskommelsen: (avvikande bevakningstid, avsaknad av individuellt PSA-värde mm, se nedan ”remisstext”).
- Remisser där det önskas uppföljning av annat än PSA-värdet.

3 Struktur i inremissen

Med tanke på att remisstexten kommer kopieras i patientjournalen och i kommentarrutan vid beställning av PSA-prov i RoS, är det viktigt att texten är standardiserad. Inremisser som inte innehåller standardiserade uppgifter kommer att avvisas för komplettering till urologen. Inget annat än PSA ska kontrolleras.

3.1 Remiss från VO Urologi

- Till Medicinsk: *Vårdc Jour Örebro*
- Till Vårdenhet: *VC jour Öo Vårdenhet*
- Diagnos, fråga, önskad undersökning: Årliga PSA kontroller efter SVF utan malignitet

Remisstexten ska innefatta:

Hur länge provtagningen kommer att fortgå (slutdatum ex hösten 2028)

PSA gränsvärde som skall föranleda ny remiss till VO Urologi enligt SVF

3.2 Avvisning

Standardsvar 1

Remissen avvisas då nödvändiga uppgifter saknas. Remisstexten ska innefatta:

Slutdatum på kontrollerna

PSA gränsvärde som föranleder nystart av SVF prostatacancer.

Standardsvar 2

”PSA-provtagning Vårdcentralsjouren” tar emot remisser endast från VO Urologi och omhändertar inga andra medicinska frågeställningar än kontroller av PSA för patienter som har genomgått SVF för prostatacancer utan att malignitet har påvisats. Remissen avvisas då frågeställningen inte innefattas av mottagningens uppdrag.

4 Medicinsk vårdadministratör tar emot remissen i RoS

4.1 Remissbekräftelse till VO Urolog

Inremissen slutsvaras av VCJ i RoS:

Vi har mottagit remiss angående PSA kontroller. Patienten kommer att kallas enligt angiven planering.

Mvh

PSA-provtagningen Vårdcentralsjouren Örebro

4.2 Remissbekräftelse till patient

Använd Brevmall i NCS Cross - **PSA Remissbekräftelse patient**

4.3 Journalanteckning och diagnos

Texten från inremissen (kan vid behov redigeras) kopieras och skrivs in i patientens VCJ journal NCS Cross som anteckning ”Adm” på ”PSA-sjuksköterska”.

Diagnos: R79-P Onormal blodkemi.

4.4 Beställning av prover i RoS

- Medicinsk enhet: Vårdcentralsjour Örebro PRIM
- Vårdenhet: Vårdcentralsjour Ö-o vårdenhet PRIM
- Remittent – ”A PSAkontrollfil
- Anamnes frågeställning – kopiera text från patientens journal/ remissen. Ex ”Planerade kontroller av PSA (efter SVF utan påvisad malignitet) tills våren/hösten 2025, intervall 12 månader. Återremiss till urologen om $PSA \geq 7,5 \mu\text{mol/l}$.”
- Provtagningstid: **mars och september** varje år. Sätt upp pat på väntelista (mars-sept). Patienter som remitteras första halvan av åren (till 30/6) kallas till provtagning nästkommande mars. De som remitteras andra halvan av året kallas till provtagning september året efter.

4.5 Kalla patient till provtagning

Genomgång av väntelista för PSA-patient i februari och augusti

Kallelse skickas använd Brevmall i NCS Cross – **PSA Kallelse provtagning**

5 Genomgång av provsvar – sjuksköterska

Varje vecka under mars-april och sept-oktober

Kontroll av inkommande prover Inkorg för remittent/A PSAkontrollfil och jämförelse av PSA resultatet med värdet som finns i journalen/ kommentar i provtagningen

5.1 Värdet är högre än individuella gränsen

Om värdet är **högre än den individuella gränsen** ska patienten återremitteras till VO Urologi. Sköterskan lämnar över ärendet till MLU.

MLU skickar remiss till VO Urologi enligt SVF och gör en journalanteckning.

Journalanteckning:

PSA-kontroller efter utredning, SVF prostatacancer utan påvisad malignitet. Vid senaste kontroll ligger PSA ... dvs högre än den individuellt insatta gränsen. Patienten remitteras till VO Urologi enligt SVF.

Återremiss i RoS

- **Medicinsk enhet:** VO Urologi USÖ
- **Vårdenhet:** Urol mott USÖ
- Rutinremiss
- Öppenvård
- Diagnos, fråga, önskad undersökning: SVF- Prostatacancer. Högt PSA värde

Remisstext:

”Patienten genomgår PSA-kontroller efter SVF prostatacancer utan påvisad malignitet. Vid senaste kontroll ligger PSA ... dvs över individuellt insatta gränsen för återremittering. *Annan information kring patienten som underlättar urologensbedömning, ex nytillkomna sjukdomar, stroke, palliativ vård* Tacksam omhändertagande.

Mvh

PSA-provtagning Vårdcentralsjouren

Meddelande till patienten

Välj Brevmall i NCS Cross – **PSA Provsvar högt värde**

5.2 Värdet är under individuella gränsen

Om värdet ligger under individuella gränsen kontrollerar man om patienten ska ha fortsatta kontroller (slutdatum finns som kommentar i provtagningen)

Journalanteckning: PSA-kontroller efter SVF prostatacancer utan påvisad malignitet. Normalt prov.

- a) vid avslutade kontroller skickas slutmeddelande till patienten

Journalanteckning: PSA-kontroller efter SVF prostatacancer utan påvisad malignitet. Normalt prov. Kontrollerna avslutas enligt planeringen.

- b) vid fortsatta kontroller skickas meddelande om provresultatet
- c) Patienten sätts upp på VL för nästa kontroll

5.3 PSA-värdet lägre än gränsvärde/meddelande till patient

Välj Brevmall i NCS Cross – **PSA provsvar normalt värde**

5.4 Avslut normala värden

Alla värden normala. Brev till patient – Välj Brevmall i NCS Cross – **PSA Provsvar slutsvar**

5.5 Uteblivna patienter

Genomgång planerade prover för A PSAkontrollfil maj och december

Provtagningen flyttas till nästkommande provtagningsstillfället dvs provet tas bort från RoS och patienten sätts upp på VL.

Journalanteckning: Patienten har uteblivit den planerade PSA provtagningen. Kallas igen om 4 månader.

Om patienten uteblir två gånger avslutas kontrollerna.

Journalanteckning: Patienten har uteblivit PSA- kontrollerna två gånger. Kontrollerna avslutas.

Om patienten uteblir sista kontrollen, kallas han en gång till nästkommande provtagningsstillfället. Om patienten uteblir igen och efter det avslutas om han uteblir igen.

Journalanteckning: patienten har uteblivit sista PSA-kontroll. Har uppvisat normala värden under uppföljningstiden. Avslutas enligt planeringen.

5.6 Avlidna patienter

Avlidna patienter tas bort från lista omgående.

5.7 Icke kurativa patienter under kontrollperioden

- Dessa patienter tas bort från listan om VCJ får reda på det?
- Hur kommuniceras detta för patienten?
- Vem gör det?