



Remiss autolog blodgivning

Remitterande enhet: Kopia/akutsvar sänds till: <input type="checkbox"/> Öppenvård <input type="checkbox"/> Inneliggande	Personnr: Namn: Adress: Telefon:
Remissdatum	
Rem läkare: Namn: Adress:	Patient data: Hb _____ g/L Vikt _____ kg Smittscreen utfört (HBV, HCV, HIV, HTLV, Lues) <input type="checkbox"/> Jehovas vittne: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Remiss till: <input type="checkbox"/> Aferesmottagningen, USÖ Tel. 019-6022639 <input type="checkbox"/> GeBlod Karlskoga lasarett Tel. 0586 - 66292	
Indikation för autolog blodgivning	
Inför planerad operation Diagnos/planerat ingrepp: Operationsdatum: Inlägges avdelning:	Infrysning för eget behov (frystblod) <input type="checkbox"/> Sällsynt blodgrupp: _____ - negativ <input type="checkbox"/> Sällsynt eller multipla erytrocytantikropp(ar): anti - _____ - _____ - _____ - _____
Önskat antal blodenheter <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> _____	
Järntabletter 100 mg 1 x 2 är ordinerade <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Information till remitterande klinik Autolog blodgivning (egenblodgivning) kan göras inför planerade operationer. Patientens hälsa ska tillåta avtappning av 450 mL blod det önskade antalet gånger utan risk. Blodvolymen är relaterad till kroppsvikten. För patienter med kroppsvikt < 50 kg och/eller yngre än 18 år eller över 70 år bör en samlad bedömning göras utifrån Hb, vikt, ålder och antalet planerade autologa enheter (en mindre tappningsvolym kan då bli aktuell). Väl ifylld remiss skickas i god tid före planerad operation. Ange antal önskade blodenheter. Autolog blodgivning sker i så nära anslutning som möjligt till operationen. I regel kan blodtappning genomföras med en veckas intervall, med en sista enhet som tappas 7 till minimum 3 dagar före operationsdagen. Patienten ska ta järntabletter för att öka möjligheterna att hålla Hb-nivån. Hållbarheten av autologa blodenheter är 6 veckor i kylförvaring. Patienttext "Autologblod finns på Blodcentralen" kommer att synas i InterInfo, Klinisk Portal. Vid blodbeställning ska BAS-test (serologiskt förenlighetsprövning) utföras på vanligt sätt. På blodbeställningssedeln anges att autologblod finns. Debitering sker oavsett om blodenheter används eller ej. Kontraindikationer: Aktiv systemisk bakterieinfektion, svår hjärt- eller lungsjukdom (t.ex. ventrikulär arytm, aortastenosis, instabil angina, hjärtsvikt), blödersjukdom, aktiv infektion med HBV, infektion med HCV, infektion med HIV1/2, infektion med HTLV 1/2, hypertoni (> 180/100), hypotoni, aktiv epilepsi, Hb < 100-110 g/L.	
Remitterande läkare har tagit del av informationen nedan och bedömer att patienten är medicinsk lämpad för autolog blodgivning	
Läkarens namn Sign.: Datum:	